

MICENE PRO

Fiche d'identité

Nom commercial : **MICENE PRO**

Composition : **KIRALAXYL (Nom ISO:
BENALAXYL-M) 4 %
MANCOZEB 65 %**

N° AMM : **2080061**

Type d'action : **FONGICIDES**

Formulation : **(WP) POUDRE MOUILLABLE**

Conditionnement : **5kg**

Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Echalotes	Trt Part.Aer.	Mildiou	2,5 KG/HA	3	28 jours	20 m
Usage : Utilisation préventive en période à risque en fonction des Avertissements Agricoles spécifiques. Dose :						
Oignons	Trt Part.Aer.	Mildiou	2,5 KG/HA	3	28 jours	20 m
Usage : Utilisation préventive en période à risque en fonction des Avertissements Agricoles spécifiques. Dose :						
Pommes de terre	Trt Part.Aer.	Mildiou	2,5 KG/HA	2	14 jours	20 m
Usage : Application en période de croissance active de la pomme de terre dans le cadre d'un programme de traitement. Dose :						
Tomates - plein champ	Trt Part.Aer.	Mildiou	2,5 KG/HA	2	14 jours	20 m
Usage : Usage en plein champ uniquement. Utilisation préventive en période à risque en fonction des Avertissements Agricoles spécifiques. Dose :						

Description

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H361d Susceptible nuire au fœtus

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

MICENE PRO

Performance

Grâce à l'association de deux matières actives aux modes d'action complémentaires, MICENE® Pro présente une efficacité préventive d'un très haut niveau contre le mildiou en empêchant son installation, y compris dans les tous premiers jours de la phase d'incubation.

Le Kiralaxyl® (bénalaxyl-M) est l'énantiomère actif du bénalaxyl. Son action systémique et prolongée permet de protéger les organes néoformés au cours de la croissance de la plante, par action directe sur le mycélium à l'intérieur des feuilles.

Le mancozèbe est un fongicide multisite de contact, qui permet d'inhiber la germination des spores.

Dose et Conditions d'emploi

Pomme de terre

MICENE® Pro s'utilise à 2,5 kg/ha, en préventif, en période de croissance active de la pomme de terre afin de bénéficier de l'action systémique ascendante et ainsi protéger les organes présents et néoformés.

MICENE® Pro s'inscrit dans un programme de traitements alternant les matières actives dans la limite de 2 applications de fongicides de la famille des phénylamides, avec un renouvellement tous les 7 jours jusqu'au 5 juillet au plus tard.

En dehors de la période de pousse active, utiliser des fongicides de familles chimiques différentes.

Tomate / Oignon - Echalote

MICENE® Pro s'utilise à 2,5 kg/ha, préventivement, en période à risque (préférentiellement en période de croissance active).

Le programme de protection contre le mildiou ne doit pas dépasser 3 traitements de la famille des phénylamides sur oignon et échalote, et 2 sur tomate.

Remarques importantes :

Suivre les recommandations émises par les bulletins phytosanitaires et les modèles de prévision pour évaluer l'évolution du mildiou et gérer les risques de résistance des mildious (*Phytophthora infestans* et *Peronospora destructor*) aux fongicides de la famille des phénylamides.

S23 Ne pas respirer les aérosols

S36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

S61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Recommandations

Verser la quantité nécessaire de MICENE® PRO dans la cuve du pulvérisateur à moitié remplie d'eau sous agitation. Compléter le remplissage de la cuve en maintenant l'agitation. Laisser l'agitation en marche pendant le trajet et la pulvérisation.

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial :

MICENE PRO

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H361d Susceptible nuire au fœtus

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

MICENE PRO



Mention d'avertissement :

Attention

Mention de danger :

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H361d Susceptible nuire au fœtus
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/...
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un service de collecte spécifique.

DRE

48h

Détenteur homologation :

ISAGRO

Marque déposée :

Réglementation transport ADR :

Voir FDS

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H361d Susceptible nuire au fœtus
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.